


## 休薬リストの見方について

- |                  |       |
|------------------|-------|
| ① 糖尿病薬 SGLT2 阻害剤 | 2頁    |
| ② 出血傾向リスクの薬剤     | 3頁、4頁 |
| ③ 血栓リスクの薬剤       | 5頁    |
| ④ 創傷遅延リスクの薬剤     | 6頁    |

一般商品名でア行～ワ行の並びになっています。

## 休薬期間の考え方

例) アスピリンを手術前に7日間休薬する場合



## 健康食品・サプリメントの術前中止について

手術前2週間は摂取を中止する

休薬期間はあくまで目安です。

休薬および手術可否の判断は、手術を担当する医師、または、麻酔科医師にご相談ください。

## 糖尿病薬 SGLT2 阻害剤（ケトアシドーシスのリスク）

商品名	一般名	休薬目安
アプルウェイ	トホグリフロジン水和物	3日間
カナグル	カナグリフロジン水和物	3日間
カナリア	カナグリフロジン水和物/テネグリプリン臭化水素酸塩水和物	3日間
ジャディアンス	エンパグリフロジン	3日間
スーグラ	イプラグリフロジン L-プロリン	3日間
スージャヌ	イプラグリフロジン L-プロリン/シタグリプリン酸塩水和物	3日間
デベルザ	トホグリフロジン水和物	3日間
トラディアンス	エンパグリフロジン/リナグリプチン	3日間
フォシーガ	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	3日間
ルセフィ	ルセオグリフロジン水和物	3日間

## 凝固系に影響を及ぼす内服薬（出血傾向リスク アーサ行）

商品名	一般名	休薬目安
アンプラーグ	サルポグレラート塩酸塩	1-2日間
イグザレルト	リバーロキサバン	1日間
イムブルビカ	イブルチニブ	3-7日間
エパデール	イコサペント酸エチル	7-10日間
エフィエント	プラスグレル塩酸塩	1日間
エリキューズ	アピキサバン	1-2日間
オパールモン	リマプロスト アルファデクス	1日間
カルケンス	アカラブルチニブ	3日間
キャブピリン	アスピリン／ボノプラザンフマル酸塩	7日間
クロピドグレル	クロピドグレル硫酸塩	14日間
ケアロード	ベラプロストナトリウム（徐放性製剤）	2日間
ケタス	イブジラスト	3日間
コメリアンコーワ	ジラゼプ塩酸塩水和物	2日間
コンプラビン	クロピドグレル硫酸塩／アスピリン	14日間
サアミオン	ニセルゴリン	2-3日間
サルポグレラート	サルポグレラート塩酸塩	1-2日間
ジピリダモール	ジピリダモール	1-2日間
ジラゼプ	ジラゼプ塩酸塩水和物	2日間
セロクラール	イフェンプロジル酒石酸塩	1-2日間

## 凝固系に影響を及ぼす内服薬（出血傾向リスク タ-ワ行）

商品名	一般名	休薬目安
タケルダ	アスピリン／ランソプラゾール	7日間
ドルナー	ベラプロストナトリウム（即放性製剤）	1日間
ニセルゴリン	ニセルゴリン	2-3日間
バイアスピリン	アスピリン	7日間
パナルジン	チクロピジン塩酸塩	10-14日間
バファリン	アスピリン／ダイアルミネート	7日間
プラザキサ	ダビガトランエテキシラート メタンスルホン酸塩	1-4日間
プラビックス	クロピドグレル硫酸塩	14日間
ブリリント	チカグレロル	5日間
プレタール	シロスタゾール	3日間
プロサイリン	ベラプロストナトリウム（即放性製剤）	1日間
プロレナール	リマプロスト アルファデクス	1日間
ベラサス	ベラプロストナトリウム（徐放性製剤）	2日間
ベラプロスト Na	ベラプロストナトリウム（即放性製剤）	1日間
ペリシット	ニセリトロール	1日間
ペルサンチン	ジピリダモール	1-2日間
ベレキシブル	チラブルチニブ塩酸塩	7日間
リクシアナ	エドキサバントシル酸塩水和物	1日間
ロコルナール	トラピジル	2-3日間
ロトリガ	オメガ-3 脂肪酸エチル	7-10日間
ロレアス	クロピドグレル硫酸塩／アスピリン	14日間
ワーファリン	ワルファリンカリウム	3-5日間
ワルファリンK	ワルファリンカリウム	3-5日間

## 凝固系に影響を及ぼす内服薬（血栓リスク）

商品名	一般名	休薬目安
アンジュ	レボノルゲストレル / エチニルエストラジオール	4週間
エビスタ	ラロキシフェン塩酸塩	3日間
ジェミーナ	レボノルゲストレル / エチニルエストラジオール	4週間
シンフェーズ	ノルエリステロン / エチニルエストラジオール	4週間
トリキュラー	レボノルゲストレル / エチニルエストラジオール	4週間
ビビアント	バゼドキシフェン酢酸塩	3日間
ファボワール	デスゲストレル / エチニルエストラジオール	4週間
プレマリン	統合型エストロゲン	4週間
マーベロン	デスゲストレル / エチニルエストラジオール	4週間
ヤーズ	デスゲストレル / エチニルエストラジオール ベータデクス	4週間
ヤーズフレックス	デスゲストレル / エチニルエストラジオール ベータデクス	4週間
ラベルフィーユ	レボノルゲストレル / エチニルエストラジオール	4週間
ラロキシフェン	ラロキシフェン塩酸塩	3日間
ルナベル	ノルエリステロン / エチニルエストラジオール	4週間

## 創傷治癒遅延が懸念される薬剤

商品名	一般名	休薬目安
アバスチン	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	6-8週間
アフィニトール	エベロリムス	9日間
インライタ	アキシチニブ	1-2日間
ヴォトリエン ト	パゾパニブ塩酸塩	7日間
オフェブ	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	6日間
カプレルサ	バンデタニブ	24日間
カボメティクス	カボザンチニブリンゴ酸塩	最低21日間
サイラムザ	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	28日間
ザルトラップ	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	28日間
スーテント	スニチニブリンゴ酸塩	7日間
スチバーガ	レゴラフェニブ水和物	14日間
トーリセル	テムシロリムス	7日間
ネクサバール	ソラフェニブトシル酸塩	7日間
ベバシズマブ BS	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	6-8週間
ラパリムス	シロリムス	7日間
レンビマ	レンバチニブメシル酸塩	2-7日間